

EtiaXil

DÉTRANSPIRANT

EXTREME

Transpiration
excessive

5 jours

Peaux normales

ROLL-ON
SANS PARFUM

TRANSPIRER, C'EST NATUREL...

La transpiration est un phénomène normal et quotidien, été comme hiver. La sueur, sécrétée par les glandes sudoripares, assure une fonction d'élimination et d'équilibre thermique. Il en existe environ 4 millions, réparties sur l'ensemble du corps, dont seulement 25 000 au niveau des aisselles.

... TROP TRANSPIRER, C'EST GÊNANT

Au quotidien, de nombreuses situations peuvent provoquer une hausse de la transpiration : stress, peur, émotivité, forte chaleur ou effort physique... expériences que nous vivons régulièrement à la maison, dans la rue, au bureau. Cette transpiration excessive se traduit souvent par des situations gênantes : humidité, taches, auréoles et fortes odeurs.

www.etiaxil.fr

Fabriqué au Danemark
par Riemann A/S
DK-3400 Hilleroed
www.riemann.com

COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE
FRANÇAISE
Place Lucien Auvert
77020 MELUN Cedex - FRANCE

CONSEILS D'UTILISATION

Pour une meilleure pénétration des principes actifs respecter impérativement la règle des "3 S".

1. Appliquer le Soir

Le produit s'applique impérativement le soir, avant le coucher. Seul un corps au repos permet au produit d'agir en toute efficacité.

2. Sur une peau Sèche

Avant l'application, les aisselles doivent être parfaitement sèches (si nécessaire, utiliser un séchecheveux). Pendant les heures qui suivent, éviter toute situation qui pourrait favoriser la transpiration ou l'humidité.

3. Sur une peau Saine

Les aisselles doivent être parfaitement propres et ne présenter aucune forme d'irritation (plaie ou phénomène pathologique). Si tel est le cas, soigner ces irritations avant de commencer l'application du produit.

Après rasage ou épilation, respecter 48 heures de délai avant d'appliquer le produit.

MODE D'EMPLOI

- Agiter avant emploi.
- Le Soir, sur une peau Sèche et Saine (voir paragraphe précédent), appliquer le produit sur chacune des aisselles.
- Laisser sécher naturellement à l'air.
- Le lendemain, laver les aisselles à l'eau et au savon.

FRÉQUENCE

Dans un premier temps, appliquer ETIAXIL EXTRÊME Peaux Normales tous les soirs jusqu'à l'obtention du résultat souhaité (normalement en 2 à 3 jours). Dès que le niveau de confort souhaité est atteint, réduisez la fréquence des applications d'Etiaxil à raison de 2 à 3 fois par semaine, ou aussi souvent que nécessaire pour garder la transpiration sous contrôle. L'arrêt définitif du traitement entraîne la disparition de l'efficacité du produit.

ETIAXIL, TRAITEMENT DE LA TRANSPiration

Seule une réduction sensible de la transpiration permet de remédier à ces situations.

Utilisé régulièrement, Etiaxil traite la transpiration excessive des aisselles grâce à sa formule unique. Le chlorure d'aluminium hexahydraté agit directement sur les glandes sudoripares. L'alcool, qui potentialise l'action du chlorure d'aluminium, assure également une fonction antibactérienne pour détruire les agents responsables de la formation d'odeurs gênantes.

L'action couplée de ces deux actifs permet ainsi de mettre au repos les glandes sudoripares sans les altérer, et de réguler le débit de la transpiration.

Etiaxil Détranspirant existe en formule aisselles ou pieds, pour peaux sensibles ou peaux normales.

Demander conseil à un pharmacien.

PARTICULARITES D'ETIAXIL EXTRÊME

- Le produit est inodore. Il est compatible avec vos produits parfumants habituels : déodorant, eau de toilette, parfum...
- Son usage est exclusivement externe.
- Lors des premières applications, son efficacité peut engendrer quelques irritations chez certaines personnes. Dans ce cas, rincer les aisselles à l'eau et utiliser un produit apaisant pour la peau (crème, lait, lotion). Attendre le soir suivant pour reprendre le traitement, en diminuant la quantité de produit appliquée. Si les irritations persistent, suspendre le traitement et consulter un médecin.
- Il convient de noter qu'Etiaxil peut décolorer ou endommager certains textiles.
- Éviter tout contact avec des bijoux ou d'autres surfaces en métal poli.
- Ne pas utiliser ce produit chez l'enfant, sans l'avis et le conseil d'un pharmacien ou d'un médecin.

